

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΩ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗ ΑΠΟ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΟ ΚΑΙ ΣΕ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗ ΑΠΟ ΠΟΝΤΙΚΟΦΑΡΜΑΚΟ

1. Δεν χορηγούμε εμετικό και δεν κάνουμε καμία προσπάθεια να προκαλέσουμε εμετό με άλλους τρόπους (ξίδι, γάλα κ.λπ.) αν δεν είναι γνωστή η στιγμή που ο σκύλος κατανάλωσε το ποντικοφάρμακο/φυτοφάρμακο ή δεν διατηρεί τη συνείδησή του, καθώς μπορεί να προκαλέσουμε μεγαλύτερο πρόβλημα και να οδηγήσουμε σε θάνατο το ζώο κατά την επαναφορά του ποντικοφάρμακου/φυτοφάρμακου και του στομαχικού περιεχομένου στον οισοφάγο του.

2. Η θεραπεία με τη Βιταμίνη K1 ολοκληρώνεται μετά από 1-2 εβδομάδες ανάλογα με την κατάσταση του σκύλου. Επομένως προσκομίζουμε άμεσα τον σκύλο στον κτηνίατρο για να εκτιμήσει την κατάσταση υγείας του σκύλου και να μας δώσει οδηγίες για την ολοκλήρωση της θεραπείας.

3. Δεν χορηγούμε ατροπίνη αν οι σφυγμοί του σκύλου είναι πολύ υψηλοί.

ΟΜΑΔΑ ΣΥΜΠΡΑΞΙΣ

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΚΥΛΟ ΜΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΜΕΝΟΥ ΔΟΛΩΜΑΤΟΣ (ΦΟΛΑΣ) ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ



Οι παραπάνω ενέργειες αποτελούν τις ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ που πρέπει να δοθούν ΑΜΕΣΑ στο ζώο σε συνθήκες πεδίου. Σε κάθε περίπτωση, είναι απαραίτητο να μεταφερθεί το συντομότερο δυνατόν σε κτηνιατρείο ώστε να γίνει εκτίμηση της γενικής κατάστασης της υγείας του και να ολοκληρωθεί κατάλληλα η θεραπευτική προσπάθεια.



Καλλιστώ
περιβαλλοντική οργάνωση
για την άγρια ζωή και τη φύση
www.callisto.gr



Δωρητής

ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ
STAVROS NIARCHOS FOUNDATION

ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΤΑΛΑΒΩ ΤΗ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗ

ΑΠΟ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΟ:

- Μεγάλη ποσότητα σάλιου (σιελόρροια) και δακρύων (δακρύρροια).
- Δυσκολία στην αναπνοή (δύσπνοια).
- Εμετοί, διάρροια.
- Έλλειψη συντονισμού, σπασμοί, τρέμουλο.

ΠΩΣ ΘΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΩ ΤΗ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗ

ΑΠΟ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΟ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ:

Βήμα 1: Εάν ο σκύλος διατηρεί τη συνείδησή του τότε προσπαθούμε να του προκαλέσουμε εμετό μέσα σε 2 ώρες από τη στιγμή κατάποσης του ποντικοφάρμακου.

Η ποσότητα που απαιτείται είναι μισή αμπούλα εμετικού (Filtalon) για κάθε 10 kg σωματικού βάρους (π.χ. για σκύλο 40 kg χορηγούμε 2 αμπούλες Filtalon) και η χορήγηση γίνεται κάτω από το δέρμα (υποδόρια).

Βήμα 2: Χορηγούμε ατροπίνη όταν ο σκύλος «βγάζει» μεγάλη ποσότητα σάλιου (σιελόρροια). Η ποσότητα που απαιτείται είναι μισή αμπούλα για κάθε 10 kg σωματικού βάρους ενδομυϊκά (στο μπούτι) μέχρι να σταματήσει η σιελόρροια.

Βήμα 3: Σε σκύλο που έχει σταματήσει να κάνει εμετό δίνεται ενεργός άνθρακας (καρβουνάκι). Η ποσότητα που απαιτείται είναι 2 διπλά χάπια (2 μπλε και 2 κόκκινα) για κάθε 10 kg σωματικού βάρους (π.χ. για σκύλο 40 kg χορηγούμε 8 μπλε και 8 κόκκινα χάπια).

ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΤΑΛΑΒΩ ΤΗ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗ

ΑΠΟ ΠΟΝΤΙΚΟΦΑΡΜΑΚΟ:

- Αιμορραγία από τη μύτη, τον πρωκτό, τα ούλα.
- Αίμα σε εμετό, αίμα σε κόπρανα.
- Αστάθεια, σπασμοί, τρέμουλο.
- Μεγάλη ποσότητα σάλιου (σιελόρροια) και δακρύων (δακρύρροια).
- Δυσκολία στην αναπνοή (δύσπνοια).

ΠΩΣ ΘΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΩ ΤΗ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗ

ΑΠΟ ΠΟΝΤΙΚΟΦΑΡΜΑΚΟ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ:

Βήμα 1: Εάν ο σκύλος διατηρεί τη συνείδησή του τότε προσπαθούμε να του προκαλέσουμε εμετό μέσα σε 2 ώρες από τη στιγμή κατάποσης του ποντικοφάρμακου.

Η ποσότητα που απαιτείται είναι μισή αμπούλα εμετικού (Filtalon) για κάθε 10 kg σωματικού βάρους (π.χ. για σκύλο 40 kg χορηγούμε 2 αμπούλες Filtalon) και η χορήγηση γίνεται κάτω από το δέρμα (υποδόρια).

Βήμα 2: Χορηγούμε το αντίδοτο, δηλαδή βιταμίνη K1 (κονάκιο). Η ποσότητα που απαιτείται είναι 5 αμπούλες για κάθε 10 kg σωματικού βάρους (π.χ. για σκύλο 40 kg χορηγούμε 20 αμπούλες κονάκιο) και η χορήγηση γίνεται κάτω από το δέρμα (υποδόρια) σε διάφορα σημεία του σώματος.

Βήμα 3: Σε σκύλο που έχει σταματήσει να κάνει εμετό δίνεται ενεργός άνθρακας (καρβουνάκι). Η ποσότητα που απαιτείται είναι 2 διπλά χάπια (2 μπλε και 2 κόκκινα) για κάθε 10 kg σωματικού βάρους.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ - ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗ

Βήμα 1 Filtalon

Βήμα 2 Ατροπίνη

Βήμα 3 Ενεργός
άνθρακας
(καρβουνάκι)

ΑΠΟ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΟ

Μισή αμπούλα για κάθε 10 kg σωματικού βάρους κάτω από το δέρμα (υποδόρια).

Μισή αμπούλα για κάθε 10 kg σωματικού βάρους ενδομυϊκά (στο μπούτι).

2 διπλά χάπια (2 μπλε και 2 κόκκινα)
για κάθε 10 kg σωματικού βάρους
από το στόμα.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ - ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗ

Βήμα 1 Filtalon

Βήμα 2 Βιταμίνη Κ1
(κονάκιον)

Βήμα 3 Ενεργός
άνθρακας
(καρβουνάκι)

ΑΠΟ ΠΟΝΤΙΚΟΦΑΡΜΑΚΟ

Μισή αμπούλα για κάθε 10 kg σωματικού βάρους κάτω από το δέρμα (υποδόρια).

5 αμπούλες για κάθε 10 kg σωματικού βάρους (υποδόρια).

2 διπλά χάπια (2 μπλε και 2 κόκκινα)
για κάθε 10 kg σωματικού βάρους
από το στόμα.



ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΑΤΣΑΡΗ ΧΡ. 10, ΚΑΛΟΥΤΣΙΑΝΗ, ΤΗΛ: 26510 25757

ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤ. & ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΙΣΜ

ΑΝΑΤΟΛΗ, ΤΗΛ: 26510 83318

ΣΙΝΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ & ΚΡΑΨΗΣ, ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΑ, ΤΗΛ: 26510 49460

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 97, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ, ΤΗΛ: 26510 63348

ΠΑΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ

ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ 1 & ΠΑΠΑΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΕΟΧΩΡΟΠΟΥΛΟ
ΤΗΛ: 26510 67115

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΒΑΣ. & ΣΟΥΛΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΛΑΜΠΡΟΥ ΣΠΥΡΟΥ 78Α, ΠΛΑΤΑΝΟΣ, ΤΗΛ: 26515 54320

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 133, ΚΑΤΣΙΚΑΣ, ΤΗΛ: 26510 93293

ΜΠΟΤΣΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ 41, ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ, ΤΗΛ: 26510 75525

ΓΚΟΓΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ 151, ΑΛΣΟΣ, ΤΗΛ: 26510 74061

ΚΩΣΤΗ ΣΟΦΙΑ

ΣΑΛΑΜΑΓΚΑ Δ. 4, ΚΕΝΤΡΟ, ΤΗΛ: 26510 33356

ΒΕΖΥΡΓΙΑΝΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΓΡΑΜΜΟΥ 7, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ, ΤΗΛ: 6909 081822

ΖΩΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ 77, ΤΗΛ: 6944 265939

ΤΣΟΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ 18, ΚΟΥΡΜΑΝΙΟ, ΤΗΛ: 26510 79112

ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΦΩΤΗΣ

13ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 15, ΤΗΛ: 24620 25050

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 1, ΤΗΛ: 24620 84483

ΖΙΑΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΠΟΥΣΙΟΥ 18, ΤΗΛ: 24620 28121

ΛΟΛΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΗ 45, ΤΗΛ: 24620 22933

ΚΑΓΙΑΜΠΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

ΔΕΣΚΑΤΗ, ΤΗΛ: 24620 32920